


Kaliumjodid SERB (65 mg)

Nükleer kazalarda iyot tablet kullanımı

40 yaşının altında mısın, hamile misin, emziriyor ya da evde çocuklarınla birlikte mi yaşıyorsun? iyot tabletleri, nükleer kazalarda radyoaktif zararlar karşı koruma amaçlı kullanılabilir ya da yetkili mercilerin önerileri doğrultusunda alınabilir.



iyot tabletleri neden alınmalı?

Nükleer bir kazada radyoaktif iyot havaya yayılabilir ve kirli havayı teneffüs ettiğimizde ya da kirli havayı yiyecek ve içecek vasıtasıyla aldığımızda, tiroit bezlerimize yerleşebilir. Fakat iyot tabletleri tiroit bezimizi radyoaktif iyotlara karşı korur ve tiroit kanseri riskini azaltır. İyot tabletleri yalnızca radyoaktif iyotlara karşı korur, diğer radyoaktif maddelere karşı koruma sağlamaz. Tabletlerin alınması tavsiyesi ile birlikte, 2 güne kadar evden dışarı çıkılmaması da tavsiye edilecektir. Bu sebeple tabletlerin evde muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Tabletler ne zaman alınmalıdır?

Tabletler yalnızca yetkili mercilerden gelen direktifler doğrultusunda kullanılmalıdır. Bir nükleer kaza olması durumunda, medyadan ve yetkili makamlardan yapılacak duyuruları takip ediniz www.dsa.no.

Kimler iyot tableti almalı?

Bir nükleer kaza olması durumunda, özellikle 18 yaşının altındaki çocuk ve gençler, hamilelerin ve emzirenlerin tiroit kanseri riskinin daha yüksek olması nedeniyle kullanmaları özellikle önemlidir. Bazı özel durumlarda 18-40 yaş aralığındaki kişilerin de iyot tableti almaları gerekebilir. 40 yaşından sonra tiroit kanseri riski azalmaktadır bu sebeple iyot tabletlerinin alınmasına gerek yoktur. Tiroit bezini aldirmiş olan kişilerin de iyot tableti almalarına gerek yoktur.

DiKKAT: Nükleer kazalarda kullanılan iyot tabletleri yerine iyot içeren başka bir iyot takviyesi alınmamalıdır. Ancak hamilelik sırasında günlük olarak iyot içeren takviyelere ihtiyacınız olursa, eczacınıza danışınız.

Ne kadar Kaliumjodid SERB (65 mg) almalıyım?

12 yaşından büyük herkes, hamile ve emziren kadınlar için: 2 tablet (= 130 mg)

Tabletler bol su ile ya da diğer sıvılarla birlikte yutulmalıdır. Eğer gerek duyulursa tabletler çiğnenebilir, bölünebilir veya ezilebilir; meyve suyu, reçel, süt ya da benzeri şeylerle karıştırılabilir.

3-12 yaş arası çocuklar: 1 tablet (= 65 mg)

Bol miktarda su veya dięer sıvılar ile birlikte yutulmalıdır. Eęer gerekirse tablet bölünebilir veya ezilebilir ve bir kaşık üzerine yoęurt, reęel veya dięer yarı katı yiyeceklerle verilebilir ya da suyla karıştırılabilir.

Su ile karıştırırken: Tableti bir bardaęa koyun ve biraz su ekleyin (çocuęun içebileceęi miktarda). Yaklaşık 2 dakika karıştırın - tabletin tamamı çözülmeyecektir, bu durum normaldir. İlaç dozunu çocuęa verin ve sonrasında bol bol su içirin.

1 ay-3 yaşı arası çocuklar: 1/2 tablet (= 32,5 mg)

Tableti ortadan ikiye bölün. Çocuęa tabletin yarısını verin. Çiğnenebilir veya ezilebilir ve bir kaşıkta yoęurt, reęel ya da dięer yarı katı yiyeceklerle birlikte verilebilir veya su ile karıştırılabilir.

Su ile karıştırırken: Tablet yarısını bir bardaęa koyun, biraz su ekleyin ve yaklaşık 2 dakika karıştırın. Tablet tamamı çözülmeyecektir, ancak bu durum normaldir. İlaç dozunu çocuęa verin ve sonrasında bol bol su içirin.

1 ayın altındaki çocuklar: 1/4 tablet (= 16,25 mg)

Tableti dörde bölün. Çeyreęini bir bardaęa koyun, biraz su ekleyin (yaklaşık 2-2,5 ml veya bir çay kaşığı su yeterli olacaktır) Yaklaşık 2 dakika karıştırın - tabletin tamamı çözülmeyecektir, ancak bu durum normaldir. Bir şırınga veya kaşık yardımıyla ilaç dozunu çocuęa verin ve sonrasında bol bol su içirin. Çocuklara anne sütüyle beslenip beslenmediklerine bakılmaksızın aynı miktarda ilaç dozunu verin.

Şunlara ihtiyacınız olacak: Dozaj şırıngaları eczanelerden satın alınabilir veya buna alternatif olarak bir çay kaşığı kullanılabilir.

Çocukların iyot aldıktan sonra bir doktor tarafından muayene edilmesi normalde gerekli değildir, ancak çocuęun sağlık durumu hakkında herhangi bir şüphenez varsa doktorunuza bu durumu danışmalısınız. Bunun nedeni, iyot dozu verilen yeni doğan bebeklerde (0-1 ay) düşük metabolizma riskinde hafif bir artış olmasıdır. Prematüre doğan çocuklar için iyot tabletleri genellikle hamileliğin 37. haftasını geçene kadar önerilmemektedir.

iyot tabletleri *almayın*:

Potasyum iyodüre veya ilacın içerdięi dięer bileşenlerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (hasta bilgi broşüründe listelenmiştir).

iyot tabletleri alın, ancak sonrasında doktorunuza danışın:

- Metabolik bir bozukluęunuz varsa ilacı aldıđınız zamandan itibaren 6-12 hafta sonra metabolizmaya baęlı testlerinizi kontrol ettirmelisiniz.
- Hamileyseniz ve metabolik bir bozukluęunuz varsa iyot aldıktan 2 hafta sonrası itibariyle, hamilelik sırasında metabolizmanız takip edilmelidir.
- Dermatit herpetiformis (Duhring hastalığı) varsa iyot aldıktan sonra cilt durumunuz daha da kötüye gidebilir ve doktorunuzun tedavinizde deęişiklik yapması gerekebilir.

iyot tabletleriyle ilgili bir sorunuz mu var? www.dsa.no sitesine bakınız. Burada ayrıca farklı dillerde bilgi bulabilirsiniz.